



维生素C片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：维生素C片

英文名称：Vitamin C Tablets

汉语拼音：Weishengsu C Pian

【成份】 本品每片含维生素C 0.1克。辅料为：淀粉、糊精、微晶纤维素、乙二胺四乙酸二钠、硬脂酸镁。

【性状】 本品为白色至略带淡黄色片。

【作用类别】 本品为维生素类非处方药药品。

【适应症】 用于预防坏血病，也可用于各种急慢性传染疾病及紫癜等的辅助治疗。

【规格】 0.1克

【用法用量】 口服。用于补充维生素C：成人一日1片。用于治疗维生素C缺乏：成人一次1~2片，一日3次；儿童一日1~3片。至少服2周。

【不良反应】

1.长期服用每日2~3克可引起停药后坏血病，故宜逐渐减量停药。

2.长期应用大量维生素C可引起尿酸盐、半胱氨酸盐或草酸盐结石。

3.过量服用（每日用量1克以上）可引起腹泻、皮肤红而亮、头痛、尿频（每日用量600mg以上）、恶心呕吐、胃痉挛。

【禁忌】 尚不明确。

【注意事项】

1.不宜长期过量服用本品，否则，突然停药有可能出现坏血病症状。

2.本品可通过胎盘并分泌入乳汁。孕妇服用过量时，可诱发新生儿产生坏血病。

3.下列情况应慎用：（1）半胱氨酸尿症（2）痛风（3）高草酸盐尿症（4）草酸盐沉积症（5）尿酸盐性肾结石（6）葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症（7）血色病（8）铁粒幼细胞性贫血或地中海贫血（9）镰形红细胞贫血（10）糖尿病（因维生素C干扰血糖定量）。

4.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

5.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

6.本品性状发生改变时禁止使用。

7.请将本品放在儿童不能接触的地方。

8.儿童必须在成人监护下使用。

9.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1.口服大剂量维生素C可干扰抗凝药的抗凝效果。

2.与巴比妥或扑米酮等合用，可促使维生素C的排泄增加。

3.纤维素磷酸钠可促使维生素C代谢为草酸盐。

4.长期或大量应用维生素C时，能干扰双硫仑对乙醇的作用。

5.水杨酸类能增加维生素C的排泄。

6.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品参与机体内抗体及胶原形成，组织修补（包括某些氧化还原作用），苯丙氨酸、酪氨酸、叶酸的代谢，铁、碳水化合物的利用，脂肪、蛋白质的合成，以及维持免疫功能，羟化5-羟色胺，保持血管的完整，并促进非血红素铁的吸收。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】 （1）高密度聚乙烯瓶，棕色玻璃瓶或PP/PE共聚物瓶，每瓶100片。

（2）高密度聚乙烯瓶，棕色玻璃瓶或PP/PE共聚物瓶，每瓶500片。

【有效期】 18个月

【执行标准】 《中国药典》2010年版二部

【批准文号】 国药准字H44021227

【说明书修订日期】 2010年10月1日

【生产企业】

企业名称：阿特维斯（佛山）制药有限公司

生产地址：广东省佛山市禅城区轻工二路10号

邮政编码：528000

电话号码：0757-83981345

传真号码：0757-82218181

网 址：www.actavis-china.com

022251

