



## 多潘立酮片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### 【药品名称】

通用名称：多潘立酮片

英文名称：Domperidone Tablets

汉语拼音：Duopanlitong Pian

【成份】 本品每片含多潘立酮10毫克，辅料为：乳糖、淀粉、微晶纤维素、聚维酮K90、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁、胶态二氧化硅。

【性状】 本品为白色片。

【作用类别】 本品为胃肠促动力药类非处方药品。

【适应症】 用于消化不良、腹胀、嗝气、恶心、呕吐、腹部胀痛。

【规格】 10毫克

【用法用量】 口服。成人一次1片，一日3次，饭前15~30分钟服用。

### 【不良反应】

1. 偶见轻度腹部痉挛、口干、皮疹、头痛、腹泻、神经过敏、倦怠、嗜睡、头晕等。  
2. 有时导致血清泌乳素水平升高、溢乳、男子乳房女性化等，但停药后即可恢复正常。

【禁忌】 嗜铬细胞瘤、乳癌、机械性肠梗阻、胃肠出血等疾病患者禁用。

### 【注意事项】

1. 孕妇慎用，哺乳期妇女使用本品期间应停止哺乳。
2. 建议儿童使用多潘立酮混悬液。
3. 心脏病患者（心律失常）以及接受化疗的肿瘤患者应用时需慎重，有可能加重心律失常。
4. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

### 【药物相互作用】

1. 不宜与唑类抗真菌药如酮康唑、伊曲康唑，大环内酯类抗生素如红霉素，HIV蛋白酶抑制剂类抗艾滋病药物及奈法唑酮等合用。

2. 抗胆碱能药品如痛痉平、溴丙胺太林、山莨菪碱、颠茄片等会减弱本品的作用，不宜与本品同服。

3. 抗酸药和抑制胃酸分泌的药物可降低本品的生物利用度，不宜与本品同服。

4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】 本品直接作用于胃肠壁，可增加胃肠道的蠕动和张力，促进胃排空，增加胃窦和十二指肠运动，协调幽门的收缩，同时也能增强食道的蠕动和食道下端括约肌的张力，抑制恶心、呕吐。本品不易透过血脑屏障。

【贮藏】 遮光，密封（10~30℃）保存。

【包装】（1）铝塑泡罩包装，每盒15或30片或45片；

（2）聚乙烯瓶包装，每瓶30或45片。

【有效期】 36个月

【执行标准】 WS<sub>1</sub>-（X-478）-2003Z

【批准文号】 国药准字H20093370

【说明书修订日期】 2010年9月14日

### 【生产企业】

企业名称：阿特维斯（佛山）制药有限公司

生产地址：广东省佛山市禅城区轻工二路10号

邮政编码：528000

电话号码：0757-83981345

传真号码：0757-82218181

网 址：www.actavis-china.com

如有问题可与生产企业联系

022280

